

普通期・緊急情報

イネカメムシ防除について

昨年に引き続き、夢つくしを中心にイネカメムシが発生しています。出穂期に加害されると穂が不稔となり減収の原因となります。

ほ場内で発生している場合は、以下の薬剤で速やかに対処して下さい。



【出穂直前】基幹防除

	農薬名	使用量(/10a)	使用回数	収穫前日数
粉剤	ワイドナーエース粉剤 DL	3～4kg	2 回	14 日前
液剤	エクシードフロアブル	2,000 倍 (60～150 L)	3 回	7 日前
	ブラシンフロアブル	1,000 倍 (60～150 L)	2 回	7 日前
粒剤	ガッツスター粒剤	3kg	1 回	(出穂 5 日前) 45 日前

【出穂後 10 日】補正防除

	農薬名	使用量(/10a)	使用回数	収穫前日数
粉剤	エクシード粉剤 D L	3kg	3 回	7 日前
液剤	エクシードフロアブル	2,000 倍 (60～150 L)	3 回	7 日前
粒剤	キラップ粒剤	3kg	2 回	14 日前
豆つぶ剤	スタークル豆つぶ	250g	3 回	7 日前

(農薬登録情報 2025 年 7 月 10 日時点)

※粒剤や豆つぶ剤は効果を発揮するまで時間がかかるため、散布適期の **5 日前** に散布しましょう。

※地域やほ場により、発生状況が異なるため、本田での発生状況を確認して散布して下さい。